

**A COMPLETER ET A REMETTRE AU LABORATOIRE**

Nom : _____ Nom de naissance : _____

Prénom : _____

Date de naissance : _____

Date et heure de recueil des urines : _____

AVEZ-VOUS DES SYMPTOMES ? Oui Non

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Douleurs (en urinant, bas ventre, dans les reins) | <input type="checkbox"/> Ecoulement urétral |
| <input type="checkbox"/> Brûlures mictionnelles | <input type="checkbox"/> Pertes vaginales |
| <input type="checkbox"/> Fièvre | |
| <input type="checkbox"/> Autres : _____ | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS

- Contrôle après traitement : _____ NOM DE L'ANTIBIOTIQUE _____
- Prise d'antibiotiques avant analyse : _____ NOM DE L'ANTIBIOTIQUE _____
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Avant Traitement | <input type="checkbox"/> Par sondage aller-retour | <input type="checkbox"/> Sonde à demeure (SAD) |
| <input type="checkbox"/> Grossesse | <input type="checkbox"/> Avant examen urologique ou hospitalisation | |
| <input type="checkbox"/> Après une hospitalisation | <input type="checkbox"/> Autre : _____ | |

 CBU (il est préférable de ne pas uriner dans les 4h avant le recueil)Avant tout traitement antibiotique.

- 1- Se laver les mains et, faire une toilette locale soigneuse avec la lingette.
- 2- Eliminer le premier jet d'urines dans les toilettes.
- 3- Uriner **le second jet** dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
- 4- **Identifier** le flacon.

Utilisation d'un flacon stérile : Amener dans les 2 heures à température ambiante ou dans les 12 heures si conservé au réfrigérateur. **CHLAMYDIAE / MYCOPLASME / GONOCOQUE** (il est préférable de recueillir les premières urines du matin)Au réveil et avant tout traitement antibiotique. Identifier le flacon.

- 1- Se laver les mains et, faire une toilette locale soigneuse avec la lingette.
- 2- Uriner **le premier jet** dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.

Acheminement : Fermer le sachet contenant le flacon et joindre cette fiche dûment remplie. Amener dans la matinée à température ambiante. **CHIMIE ECHANTILLON (Sucre, Albumine, ...)**

Recueillir les urines du réveil de préférence (ou après une rétention de 4 heures minimum)

Acheminement : Fermer le sachet contenant le flacon et joindre cette fiche dûment remplie. Amener dans les 2 heures à température ambiante